Versailles

a M. Le pr. chir. du Roy

Monsieur

R.

je Souhaite que cette Observation, vous paroisse aussi Spécieuse comme je desir par mon Zelle pour la chirurgie, et mon respect pour vous Monsieur, meriter le Suffrage que vous accordés a la bonne volonté, et a l'envie de Savoir. C'est avec ces Sentiments respectueux que j'ai L'honneur d'etre

Monsieur

Votre tres humble
Et tres obeissant Serviteur
Testart. Chirurgien de M.
Le Prince de tingry a L'hotel Luxembourg

Je fus envoyé il y a environ Six mois a Melun sur Seine de la part de Mr Et Mad. la Princesse de tingry pour voir une de leur parente malade au Couvent des Stes Marie. un notaire de la ville me pria de voir sa petite fille boiteuse de naissance, agée d'environ quatre ans; il l'avoit fait voir aux Chirurgiens de Melun, et meme a quelques Chirurgiens en

ARC 41 n° 1
Académie Royale de Médecine

réputation a fontainebleau; cette Enfant a l'air de la meilleure Santé du monde, la poitrine tres bien conformée, aucune déviations dans les articulations, aucune difformités dans les tete ni dans les corps des os, rien qui puisse faire Soupçonner au vice rachitique; lors qu'elle reste debout Sans marcher les malleoles et les genoux Sont a la meme hauteur, c'est ce qui en a imposé aux Chirurgiens qui l'on vû avant moi, et qui leur a fait dire que la claudication dependoit d'un vice dans les os du bassin, voila comme les parents mont rendu le fruits quils ont tiré de ces differentes consultations, j'ai poussé mes recherches plus loin, j'ai fait des habillé l'Enfant et l'a ze fait mettre toute nue Sur une table la tete posée Sur un oreiller, j'ai mis les deux pieds de niveau, je trouvé également les genoux parallele mais examinant le bassin je remarquai que l'Epine anterieure de l'ilium droite etoit plus basse ~~de plus d'un pouce~~ que la gauche de prés d'un pouce, je repoussé la cuisse droite de bas en haut Sur l'articulation du femur dans la cavité cotiloide, je parvins a quelque chose prés a porter l'epine de l'ilium droite a la meme hauteur que celle du côté gauche, Sitôt je m'aperçu que le genou et le pied droit etoient remonté en proportion, je fus pleinement convaincu

que cette extremité devoit etre plus courte que lautre; Nayant rien
trouvé raport a la jambe, j'examiné la cuisse, en la Mesurant du grand
trochanter au condile externe du meme os, et portant la mesure a
l'autre cuisse, je trouvai que cette derniere avoit de plus long ce qui faisait
la differance du parallele des deux epines anterieures des os illium.
Les parents me demanderent ce quil i avoit a faire en pareil cas,
Voila ce que le desir de leur etre bon ma Suggerer. J'ordonnai que
lon fit faire le talon dun Soulier un demi pouce plus haut que lautre,
et que le Soulier a talon haut, Soit toujours mis au pied de la jambe
longue. pretendant en alongeant ainsi cette extremité deja
trop longue, augmenter l'effort et la pression que fait tout le corps
en S'appuyant sur cette partie pour porter lautre jambe en avant.
Mon opinion ma parue appuyée de ce qu'a cet age les os nont pas
encore aquis une Solidité qui puisse empecher de Refouler les fibres
osseuses sur elles mêmes par ces efforts multipliés; tandis que lautre
extremité a la liberté de croitre pour reparer les tors de la nature.
J'ai eu des nouvelles de cette petite boiteuse, et lon ma mandé que la
jambe courte est deja Sensiblement alongée; j'ai prié les parents
de conserver les mesures enfin qu'en retournant dans ce pays la je puisse
massurer moi meme du progrés

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE